

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

INFORME DE LA QUALITAT DE L'AIRE A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Ubicació: c. del Cadí, 2 (Biblioteca Municipal)

Període: 02/05/2024 - 17/07/2024

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 1 de 16



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

INFORME RELATIU A LA CAMPANYA DE MESURAMENTS DE QUALITAT DE L'AIRE AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

FETS

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha dut a terme, entre el 2 de maig i el 17 de juliol de 2024, una campanya de mesuraments al carrer del Cadí, 2, en el municipi de Santa Margarida i els Monjos (**Annex 1**).

L'objectiu de la campanya és fer seguiment de l'estat de la qualitat de l'aire de la zona, a petició de l'Ajuntament. A més a més, es busca obtenir dades representatives en funció del règim de vents.

S'ha utilitzat la unitat mòbil 4 (UM4) per avaluar els contaminants atmosfèrics següents:

- Diòxid de sofre (SO₂)
- Sulfur d'hidrogen (H₂S)
- Diòxid de nitrogen (NO₂)
- Monòxid de carboni (CO)
- Ozó (O₃)
- Benzè (C₆H₆)
- Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µm (PM10)
- Metalls pesants
- Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP)

L'avaluació de la qualitat de l'aire s'ha realitzat tenint en compte els valors límit¹ que la normativa actual regula per a cadascun dels contaminants.

La naturalesa, procedència i afectació a la salut dels diferents contaminants atmosfèrics es mostra a l'**Annex 2**.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16.11.2007).
- Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, que incorpora a la legislació estatal la Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa (BOE núm. 25, de 29.01.2010).

¹ Valor límit: Són aquelles concentracions dels diferents contaminants que no s'han de sobrepassar durant uns períodes determinats i en les condicions estipulades, a fi de protegir en particular la salut humana i el medi.

[Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya \(XVPCA\)](#)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 2 de 16



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

- Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, per el que es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (BOE núm. 206, de 25.08.2014).
- Reial decret 39/2017, de 27 de gener, per el que es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (BOE núm. 24, de 28.01.2017).
- Reial decret 34/2023, de 24 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

CONCLUSIONS

L'avaluació de la qualitat de l'aire mostra que (**Annex 3**):

Els nivells de **diòxid de sofre (SO₂)**, **sulfur d'hidrogen (H₂S)**, **diòxid de nitrogen (NO₂)**, **partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)**, **monòxid de carboni (CO)**, **ozó troposfèric (O₃)**, **benzè (C₆H₆)**, **metalls pesants i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP)**, mesurats durant el període de la campanya, **no han superat els valors de referència legislats.**

Vist i plau,

Digna Planas Torronteras
Tècnica de la Secció d'Immissions
Signat electrònicament

Eva Pérez Gabucio
Cap de la Secció d'Immissions
Signat electrònicament

[Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya \(XVPCA\)](#)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 3 de 16

 **Generalitat de Catalunya**
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

ANNEXOS

ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DE LA UBICACIÓ

La unitat mòbil UM4 del Servei de Vigilància i Control de l'Aire es va instal·lar al carrer del Cadí, 2, en el municipi de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès, Barcelona) (Figura 1).

Les coordenades geogràfiques de l'emplaçament són:

Latitud: 41° 19' 14.1" N (387835.5 m)

Longitud: 1° 39' 35.4" E (4575211.4 m)

(Datum: ETRS89, Fus: 31N).



Figura 1: Imatge de la ubicació de la UM4 al carrer del Cadí, 2, al municipi de Santa Margarida i els Monjos.

[Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya \(XVPCA\)](#)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 4 de 16

 **Generalitat de Catalunya**
 Departament de Territori, Habitatge
 i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
 i Qualitat Ambiental**

A continuació, es mostra l'entorn més proper de la localització exacta on s'ha ubicat la unitat mòbil (**Figura 2**):



Figura 2: Entorn més proper de la ubicació de la UM4. Font: Google Earth.

Les distàncies entre la unitat mòbil i les principals vies de circulació de trànsit i altres possibles potencials fonts d'emissió de contaminants (**Figures 3 i 4**), són les següents:

- **N-340a:** situada a uns 145 metres de distància, aproximadament, al sud-est.
- **AP-7:** situada a uns 970 metres de distància, aproximadament, al nord-oest.
- **N-340:** situada a uns 1180 metres de distància, aproximadament, al nord-oest.
- **Empresa Cementos Portland Valderrivas (activitat cimentera):** situada a uns 890 metres de distància, aproximadament, al sud.
- **Empresa Cementos Portland Valderrivas (activitat extractiva):** situada a uns 3000 metres de distància, aproximadament, al sud-est.

[Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya \(XVPCA\)](#)



Doc. original signat per:
 Digna Planas Torronteras
 26/03/2025,
 Eva Maria Pérez Gabucio
 28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
 04/04/2025 10:54:52

Pàgina 5 de 16


 **Generalitat de Catalunya**
 Departament de Territori, Habitatge
 i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
 i Qualitat Ambiental**



Figura 3: Perspectiva de la localització de la UM4, context més general i posicionament respecte a les carreteres principals. Font: Google Earth.




Figura 4: situació de l'empresa Cementos Portland Valderrivas respecte a la ubicació de la UM4. Font: Google Earth.

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
 Digna Planas Torronteras
 26/03/2025,
 Eva Maria Pérez Gabucio
 28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
 04/04/2025 10:54:52

Pàgina 6 de 16

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

**ANNEX 2: NATURALESA, PROCEDÈNCIA I AFECTACIÓ A LA SALUT DELS DIFERENTS
CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS**

Diòxid de sofre (SO₂)

Què és?	D'on ve?	Com afecta la salut?
<p>És un gas incolor i la seva olor és perceptible només a concentracions molt elevades. Aquest compost dona lloc a la pluja àcida en generar àcid sulfúric, és una font de partícules secundàries i està relacionat amb la formació de l'anomenat "smog". Es mesura amb equips automàtics, dels quals obtenim dades horàries que s'expressen en µg/m³.</p>	<p>S'origina per la combustió de carburants que contenen sofre, especialment el carbó, fet que es dona majoritàriament en relació a combustions domèstiques (per exemple a les estufes) o industrials (com per exemple a centrals tèrmiques), en el transport i per la fusió de minerals que contenen sulfurs. Les fonts naturals més importants són els volcans i els oceans.</p>	<p>El diòxid de sofre afecta el sistema respiratori i el funcionament dels pulmons, i provoca irritacions oculars. Els símptomes sobre l'aparell respiratori són tos, mucositats, agreujament de l'asma i bronquitis crònica. També augmenta la propensió de les persones a patir infeccions respiratòries.¹</p>

¹ Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sulfur d'hidrogen (H₂S)

Què és?	D'on ve?	Com afecta la salut?
<p>És un gas incolor amb una olor molt desagradable. Es mesura amb equips automàtics que ens permeten obtenir dades horàries. Els resultats s'expressen en µg/m³.</p>	<p>Acostuma a tenir un origen natural, per exemple, fonts sulfuroses, llacs i zones amb activitat geotèrmica. El seu origen antropogènic sol ser industrial, quan compostos que contenen sofre entren en contacte amb matèria orgànica: producció de coc, tractament d'aigües residuals, refineries de petroli, adobament de pell, producció de pasta de paper, etc.</p>	<p>L'exposició a concentracions baixes d'àcid sulfúric pot provocar irritació als ulls, nas i gola, així com dificultats respiratòries en persones asmàtiques, mal de cap, alteracions de la memòria, cansament i alteracions de l'equilibri. L'exposició a nivells molt alts pot produir pèrdua de coneixement i alteracions o aturades respiratòries.¹</p>

¹ Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

[Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya \(XVPCA\)](#)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 7 de 16

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

Diòxid de nitrogen (NO₂)

Què és?	D'on ve?	Com afecta la salut?
El diòxid de nitrogen és un gas format per dos àtoms d'oxigen i un de nitrogen. És de color marronós i té una olor forta . És un dels elements formadors de l' smog fotoquímico , a més d'un precursor de l'àcid nítric (un dels components de la pluja àcida i de les partícules secundàries). Els NO _x els constitueixen el NO ₂ més altres compostos que contenen nitrogen i oxigen, com el NO. Es mesura amb equips automàtics dels quals obtenim dades horàries. Els resultats s'expressen en µg/m ³ .	La principal font antropogènica és la combustió, tant de tipus mòbil (trànsit terrestre, aeri i marítim) com de tipus estacionari (industrial) . La quantitat de NO _x emesos depèn de les condicions de la combustió i de la quantitat de combustible cremat.	En concentracions superiors a 200 µg/m ³ (valor límit horari) provoca una inflamació significativa de les vies respiratòries . Els estudis epidemiològics mostren que una exposició prolongada al NO ₂ augmenta els símptomes de bronquitis en nens asmàtics . La reducció de la funció pulmonar també està relacionada amb els nivells de NO ₂ mesurats habitualment a les ciutats d'Europa i d'Amèrica del nord. ¹

¹ Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Monòxid de carboni (CO)

Què és?	D'on ve?	Com afecta la salut?
És un gas incolor, sense olor i sense gust . És el 3 ^{er} gas emès més abundant, després del CO ₂ i el vapor d'aigua. Acaba oxidant-se a CO ₂ , per la qual cosa afecta el canvi climàtic i, a més, té una certa participació en la química de l'ozó. Es mesura amb equips automàtics dels quals obtenim dades horàries i els resultats s'expressen en mg/m ³ .	S'emet a l'atmosfera per dues vies: l'emissió directa i la formació química a partir d'altres contaminants. L'emissió directa es genera en combustions incompletes (gas, carbó, gasoil o biomassa), principalment en fonts com el trànsit i les estufes per a ús domèstic .	El monòxid de carboni entra en el cos pels pulmons i s'uneix fortament a la hemoglobina de la sang. Això provoca una reducció del transport de l'oxigen a les cèl·lules del cos. Les persones amb malalties cardiovasculars són les més sensibles a l'exposició a aquesta substància i poden veure agreujada la seva malaltia. A nivells molt elevats el monòxid de carboni pot arribar a provocar la mort . ¹

¹ Air quality in Europe. EEA report. 2013.

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 8 de 16

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

Ozó (O₃)

Què és?	D'on ve?	Com afecta la salut?
L'ozó és un gas incolor, invisible i d'olor agradable que té un gran poder oxidant. L'ozó troposfèric es troba a les capes baixes de l'atmosfera i és considerat un contaminant. No s'ha de confondre amb l'ozó que es troba a major altitud de forma natural i que està implicat en l'anomenat "forat de la capa d'ozó". Es mesura amb equips automàtics, dels quals obtenim dades horàries, i els resultats s'expressen en µg/m ³ .	No existeixen fonts destacables d'ozó, sinó que es tracta d'un contaminant secundari que es forma a partir d'altres compostos anomenats precursors, entre els quals destaquen els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, que reaccionen gràcies a la radiació solar. Els nivells més elevats s'enregistren a la primavera i l'estiu, i és un component important de l'anomenat " smog fotoquímic ".	Pot atacar les mucoses i les vies respiratòries. Pot causar tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries , disminució del rendiment, empitjorament de la funció pulmonar, malestar general; així mateix, pot provocar asma i originar malalties pulmonars . També s'ha observat que redueix la capacitat defensiva en malalties respiratòries. ¹

¹ Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Benzè (C₆H₆)

Què és?	D'on ve?	Com afecta la salut?
Es tracta d'un hidrocarbur aromàtic. És un compost orgànic volàtil (COV) que en estat vapor té una olor "aromàtica" i que es pot mesurar amb equips automàtics o manuals. La majoria dels sistemes que hi ha a la XVPCA són manuals i ens permeten obtenir dades amb resolució diària. En canvi, els equips automàtics ens permeten disposar de dades amb resolució horària. Els resultats s'expressen en µg/m ³ .	Les principals fonts d'emissió són antropogèniques. A Europa el trànsit és la font d'emissió més important d'aquest compost, però destaquen també els processos de combustió , la calefacció domèstica i l'evaporació durant la distribució d'hidrocarburs . És un dels precursors que contribueixen a la formació de l'ozó troposfèric.	Una exposició crònica al benzè pot reduir la producció de glòbuls vermells i blancs de la medulla òssia, provocant anèmia aplàstica . A més, el benzè és una substància carcinògena pels humans d'acord amb l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer. ¹

¹ WHO. Exposure to benzene: a Major Public Health Concern. Air quality in Europe. EEA report. 2013. [Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer](#)

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 9 de 16

 **Generalitat de Catalunya**
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

Partícules (PM10)

Què són?

A diferència dels contaminants gasosos, que estan formats per molècules separades d'una sola espècie, **el material particulat és una barreja complexa de partícules sòlides i líquides** formada per un conjunt de molècules de la mateixa substància o diferents. Es classifiquen segons el seu diàmetre aerodinàmic en **PM10 (diàmetres inferiors a 10 micres), PM2,5 (diàmetres inferiors a 2,5 micres) i PM1 (diàmetres inferiors a 1 micra)**. Es poden mesurar amb equips automàtics o manuals, i els resultats s'expressen en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

D'on venen?

Segons el seu origen, les partícules poden ser primàries (emeses directament) o secundàries (formades a l'atmosfera a partir d'altres contaminants). Tant les primàries com les secundàries poden tenir una part natural i una altra antropogènica. En funció de la font d'emissió tindran una composició química i una mida diferent.

Com afecten la salut?

L'exposició crònica a les partícules als nivells d'exposició que es troben a les zones urbanes i rurals dels països desenvolupats **fa augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, malalties respiratòries i càncer de pulmó**. La seva afectació a la salut humana depèn de la seva composició i de la seva mida. Les que tenen un major impacte són les PM2,5 i PM1, que tenen una mida prou petita per a penetrar fins als alvèols pulmonars.¹

¹ Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP)

Què són?

Els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) són un grup de compostos que es caracteritzen per tenir dos o més anells aromàtics condensats. **Un indicador de la presència dels HAP a l'atmosfera és el benzo(a)pirè (BaP)**, un compost orgànic format per cinc anells que **es troba en el material particulat fi**. El BaP és l'únic HAP que té objectiu de qualitat de l'aire. Les propietats semivolàtils d'alguns HAP fan que mostrin una **gran mobilitat a través del medi ambient**, de manera que es distribueixen entre l'aire, el sòl i l'aigua. Es mesuren amb mètodes manuals a partir de les mostres de PM10 i, per tant, les dades que n'obtenim són diàries. Els resultats s'expressen en ng/m^3 .

D'on venen?

Aquests compostos provenen principalment de cinc fonts: de **l'àmbit domèstic, del trànsit, de la indústria, del sector agrícola i de la naturalesa**.

Com afecten la salut?

És **carcinogen** per als humans segons l'Agència Internacional per a la Recerca sobre Càncer (International Agency for Research on Cancer, IARC).¹

¹ Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 10 de 16

Metalls pesants**Què són?**

Els metalls pesants presents a l'atmosfera que **están legislats** són **l'arsènic (As), el cadmi (Cd), el níquel (Ni) i el plom (Pb)**. En l'aire ambient, els metalls i els compostos que formen amb altres elements **es troben principalment en el material particulat**. Es mesuren amb mètodes manuals a partir de les mostres de PM10; per això, les dades que n'obtenim són diàries. Els resultats s'expressen en ng/m³.

D'on venen?

Poden tenir un **origen natural (volcans, focs, etc.)** o bé un **origen antropogènic, principalment processos de combustió, trànsit i processos industrials** (plantes de sinterització, indústries del ferro i l'acer, i indústries de metalls no fèrrics).

Com afecten la salut?

La principal via d'entrada de l'**As** al cos humà és per ingestió, especialment a través de l'aigua.¹ Per inhalació pot provocar **dolor de gola i irritació de l'esòfag**, així com **efectes en la pell**, entre d'altres.² Alguns dels compostos que forma l'**As** provoquen **càncer**.³ Pel que fa al **Cd**, la principal via d'entrada al cos humà és per ingestió, inhalació de tabac i inhalació en alguns ambients de treball. L'òrgan més afectat per l'exposició al **Cd** són els **ronyons**, on s'acumula i provoca malalties. Les exposicions prolongades per inhalació a altes concentracions poden causar **dany als pulmons**.⁴ El **Cd** també pot provocar **malalties òssies** i és classificat com a **carcinogen**.³ El **Ni** entra al cos humà principalment per ingestió o per contacte. Alguns dels compostos que forma el **Ni** són **carcinògens**.³ Aquest metall causa **reaccions al·lèrgiques a la pell** i a exposicions molt elevades provoca **bronquitis i reducció de la funció pulmonar**.⁵ El **Pb** pot afectar pràcticament qualsevol part del cos.⁶ S'acumula i afecta principalment el **sistema nerviós**, especialment dels nens,⁷ però també té efectes hematològics, com ara **anèmia**, i pot tenir **efectes sobre l'aparell reproductor masculí**. Alguns compostos del **Pb** han estat classificats com a possibles **carcinògens**.³

¹ WHO, World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy Environments. Exposure to Arsenic: A Major Public Health Concern, 2010.

² ATSDR, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine ToxFAQa, dels EUA, CAS # 7440-38-2, 2007.

³ IARC International Agency for Research on Cancer, Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, OMS, <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/>.

⁴ WHO, World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy Environments. Exposure to Cadmium: A Major Public Health Concern, 2010.

⁵ ATSDR, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine ToxFAQa, dels EUA, CAS # 7440-02-0, 2005.

⁶ ATSDR, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology and Environmental Medicine ToxFAQa, dels EUA, CAS # 7439-92-1, 2007.

⁷ WHO, World Health Organization, Preventing Disease Through Healthy Environments. Exposure to Lead: A Major Public Health Concern, 2010.

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 11 de 16

 Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

ANNEX 3: RESULTATS DE LA CAMPANYA

1. CONDICIONS METEOROLÒGIQUES


La UM4 està equipada amb una estació meteorològica completa que mesura en continu i proporciona valors 10-minutals dels següents paràmetres: *temperatura, pressió atmosfèrica, radiació solar, direcció del vent, velocitat del vent, precipitació i humitat relativa*. Aquest fet permet que es puguin relacionar els cicles diaris que s'observen per a cada contaminant amb les variables meteorològiques.

A la **Taula 1** es mostra un resum de les dades meteorològiques enregistrades durant el període de la campanya:

03/05/2024 – 16/07/2024	Màxim	Mínim	Mitjana	Acumulada
VV (m/s)	7	0	2	-
DV (°) (Consultar la Rosa dels vents)	-	-	Majoritàriament bufa de component sud-oest (210-250°)	-
TEMP (°C)	34	10	22	-
HR (%)	100	22	67	-
PRES (hPa)	1001	984	994	-
RAD.SOLAR (W/m ²)	1042	0	263	-
PREC (mm)	-	-	-	122

Taula 1: Resum de les condicions meteorològiques durant el període de la campanya (es desestimen les dades del primer i darrer dia de campanya per no disposar de dades completes de tot el dia per la instal·lació i desinstal·lació de l'equipament i estabilització dels equips).

Rosa dels vents (03/05/2024 – 16/07/2024):



Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 12 de 16



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
i Qualitat Ambiental**

2. NIVELLS D'IMMISSIÓ

S'han realitzat mesuraments dels nivells d'immissió amb equips automàtics dels contaminants atmosfèrics següents:

- Diòxid de sofre (SO₂)
- Sulfur d'hidrogen (H₂S)
- Diòxid de nitrogen (NO₂)
- Monòxid de carboni (CO)
- Ozó troposfèric (O₃)

Mitjançant analitzadors automàtics es determina la concentració d'aquests contaminants a partir d'una mostra d'aire. Tot i que s'obté una dada cada minut, només s'emmagatzemen els valors mitjans de cada 10 minuts (10-minutals). D'aquesta manera es disposa de 144 mitjanes 10-minutals cada dia (de les 00:10h fins a les 24:00h), les quals permeten monitoritzar l'evolució de la concentració de cada contaminant de forma contínua durant les 24 hores del dia.

També, s'han pres mostres dels nivells d'immissió amb equips manuals dels contaminants atmosfèrics següents:

- Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 µm (PM10)
- Benzè (C₆H₆)
- Metalls pesants
- Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP)

Mitjançant captadors manuals es determina la concentració d'aquests contaminants, tal com estableix la legislació vigent per a aquests. Pel que fa a l'obtenció del material particulat, el captador força el pas de l'aire, durant 24h, a través d'un filtre on queden retinguts els contaminants. Referent al benzè, el captador força el pas de l'aire a través d'un tub de carbó actiu on queda absorbit aquest compost. En el cas dels metalls pesants i els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), s'obtenen a partir de les mostres de les partícules en suspensió (PM10). Posteriorment, aquests filtres i tubs són recollits i enviats a analitzar a un laboratori extern.

A continuació, s'exposen en forma de taula els resultats obtinguts per a cada contaminant, els quals es comparen amb els valors de referència legiscats. A la **Taula 2**, es mostren els resultats dels mesuraments obtinguts amb els equips automàtics i a les **Taules 3, 4 i 5** els resultats dels mesuraments obtinguts amb els equips manuals.

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras
26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio
28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 13 de 16

Generalitat de Catalunya
 Departament de Territori, Habitatge
 i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
 i Qualitat Ambiental**

2.1. EQUIPS AUTOMÀTICS

Valors de referència legislativa (Reial decret 102/2011)											
Equips automàtics	Diòxid de sofre (SO ₂)			Sulfur d'hidrogen (H ₂ S)			Diòxid de nitrogen (NO ₂)		Monòxid de carboni (CO)	Ozó (O ₃)	
	Valor màxim diari (2)	Valor màxim horari (3)	Mitjana anual (1)	Valor màxim semi-horari	Valor màxim diari	Mitjana anual (1)	Mitjana anual (1)	Valor màxim horari (4)	Valor màxim 8-horàries mòbils (mg/m ³)	Llindar d'informació a la població (valor horari)	Llindar d'alerta (valor horari)
Valor límit, llindar o valor objectiu (µg/m ³ (excepte CO en mg/m ³))	125	350	---	100	40	---	40	200	10	180	240
Valor mesurat (µg/m ³ (excepte CO en mg/m ³))	4	44	2	9	4	2	9	47	0,8	128	128
% respecte al valor legislat	3%	13%	---	9%	10%	---	23%	24%	8%	71%	53%
Qualificació	No s'ha superat cap valor límit legislat			No s'ha superat cap valor objectiu legislat			No s'ha superat cap valor límit legislat		No s'ha superat el valor límit legislat	No s'ha superat cap llindar de referència legislat	

(1) És la mitjana del període de la campanya, no l'anyal, i per tant no és representativa.
 (2) No podrà superar-se en més de 3 ocasions per any civil.
 (3) No podrà superar-se en més de 24 ocasions per any civil.
 (4) No podrà superar-se en més de 18 ocasions per any civil.

Taula 2: Resultats dels mesuraments dels equips automàtics

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
 Digna Planas Torronteras 26/03/2025,
 Eva Maria Pérez Gabucio 28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
 04/04/2025 10:54:52

Pàgina 14 de 16

2.2. CAPTADORS MANUALS

Captadors manuals	Valors de referència legislativa (Reial decret 102/2011)		
	Partícules en suspensió (PM10)		Benzè (C ₆ H ₆) (4)
	Valor límit diari	Mitjana anual (1)(2)	Mitjana anual (1)(2)
Valor objectiu i valor límit legislat (ng/m ³)	50	40	5
Valor mesurat (µg/m ³)	26 ⁽³⁾	17	<0,5
% respecte al valor legislat	53%	42%	<10%
Qualificació	No s'ha superat cap valor límit legislat		No s'ha superat la mitjana anual legislada

(1) És la mitjana del període de la campanya, no l'annual, i per tant no és representativa.

(2) Número de mostres analitzades: benzè (22) i PM10 (64).

(3) Quantificat com a percentil 90,4.

(4) Límit de quantificació de 0,5 µg/m³.

Taula 3: Resultats dels mesuraments dels equips manuals

➤ METALLS PESANTS

Captadors manuals	Valors de referència legislativa (Reial decret 102/2011)			
	Cadmi (Cd) (1)	Arsènic (As) (2)	Níquel (Ni) (3)	Plom (Pb) (4)
	Valor objectiu anual	Valor objectiu anual	Valor objectiu anual	Valor límit anual per a la protecció de la salut humana
Valor objectiu i valor límit legislat (ng/m ³)	5	6	20	500
Valor mesurat (ng/m ³)	0.1	<0.6	3.1	1.7
% respecte al valor legislat	2%	<9%	16%	0.3%
Qualificació	No s'ha superat el valor objectiu	No s'ha superat el valor objectiu	No s'ha superat el valor objectiu	No s'ha superat el valor límit

Número de mostres analitzades: 33

(1) Límit de quantificació: 0,1 ng/m³

(2) Límit de quantificació: 0,6 ng/m³

(3) Límit de quantificació: 2,2 ng/m³

(4) Límit de quantificació: 1,1 ng/m³

Taula 4: Resultats dels mesuraments dels equips manuals (metalls pesants).

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
Digna Planas Torronteras 26/03/2025,
Eva Maria Pérez Gabucio 28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
04/04/2025 10:54:52

Pàgina 15 de 16

Generalitat de Catalunya
 Departament de Territori, Habitatge
 i Transició Ecològica
**Direcció General de Canvi Climàtic
 i Qualitat Ambiental**

➤ **HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS (HAP)**

		Valors de referència legislativa (Reial decret 102/2011)									
		Benzo(a)pirè	B(b)F	B(j)F ⁽¹⁾	B(k)F	B(a)A	B(g,h,i)P	Crisè	D(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P	Pirè
Captadors manuals	Mitjana anual	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Valor objectiu anual legislatiu (ng/m ³)		1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mitjana del període (ng/m ³)		<0.14	<0.14	<0.56	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14
Màxim del període (ng/m ³)		<0.14	<0.14	<0.56	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14
% respecte al valor legislatiu		<14%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Qualificació		No s'ha superat el valor objectiu legislatiu									

Taula 5: Resultats dels mesuraments dels equips manuals (HAPs).

Número de mostres analitzades: 16
 Límit de quantificació: 0,14 ng/m³
 (1) Límit de quantificació: 0,56 ng/m³

Llegenda nomenclatura:

B(b)F	B(j)F	B(k)F	B(a)A	B(g,h,i)P	D(a,h)A	I(1,2,3,c,d)P
benzo(b)fluorantè	benzo(j)fluorantè	benzo(k)fluorantè	benzo(a)antracè	benzo(g,h,i)pirè	dibenzo(a,h)antracè	indè(1,2,3-cd)pirè

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)



Doc. original signat per:
 Digna Planas Torronteras 26/03/2025,
 Eva Maria Pérez Gabucio 28/03/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 04/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03661EK1ZWEX322XZT8KUMPEE3TQ1QIX

Data creació còpia:
 04/04/2025 10:54:52

Pàgina 16 de 16